

OLIO DI SOIA

Corroborante, liberi da insetti



Composizione

Olio di soia 90% - Bagnabile q.b. a 100%

Confezioni

Confezione COD: OLIS10
tanica 10 litri; Pallet: 750 litri



Confezione COD: OLIS5
tanica 5 litri x 4 pz; Pallet 600 litri



Confezione COD: OLIS1
Flacone 1 litro x 12 pz; Pallet 720 litri



L'olio di soia è un olio vegetale ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Glycine soja (= Dolichos soja), leguminosa annuale originaria dell'Asia orientale. L'olio di soia, grazie alle sue proprietà antitranspiranti, aiuta a migliorare e potenziare le difese naturali delle piante (azione corroborante) in presenza di insetti. Sulle uova impedisce gli scambi gassosi fra embrione e atmosfera, anche come azione protettiva per mantenere il corretto equilibrio idrico delle piante, in casi di forti escursioni termiche o venti forti o troppo caldi. L'olio di soia è applicabile in frutticoltura, orticoltura e giardinaggio e può essere utilizzato in qualsiasi momento del ciclo produttivo. Non lascia residui.

Avvertenze:

Eettuare gli interventi nelle ore più fresche della giornata. Conservare il prodotto lontano dalla portata dei bambini e animali. Conservare il recipiente in luogo asciutto, fresco ed esente da gelate. Conservare al riparo dalla luce e a temperature comprese tra i 5° e 40°C. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle, la bocca, le labbra e il naso. Il prodotto non è indicato per il consumo umano, ma solo per uso botanico e agricolo. Si declina ogni responsabilità per uso improprio del prodotto. Se usato correttamente il prodotto è innocuo per l'uomo, gli animali e gli insetti utili. Smaltire l'imballo nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Concimazione fogliare - Dosi

Diluire 40-90 ml di prodotto in 10 litri di acqua, agitare bene ed irrorare la pianta da una distanza di 40-50 cm, bagnando in modo uniforme tutta la superficie, compresa la pagina inferiore delle foglie. Azione preventiva: trattare ogni 10-15 giorni, dall'inizio della oritura, no a prima della raccolta dei frutti. Azione curativa e protettiva: trattare al manifestarsi delle infestazioni e, se occorre, ripetere l'operazione 5-15 giorni dopo il primo trattamento.

